


# MANIPULATION VERTÉBRALE DORSALE DIRECTE

H. CARDIN

Hôtel-Dieu de Paris

La technique que nous présentons paraît facile. Elle est en fait délicate à bien doser. Il s'agit d'une manipulation directe.



**Figure 1**

*Nous nous proposons d'agir sur le segment T6-T7, pour un DIM situé du côté droit avec une limitation douloureuse de la rotation vers la droite.*



**Figure 2**


*Verrouillage du segment inférieur.*

*Ce verrouillage s'obtient par un appui du bord cubital de la main gauche, le pisiforme appuyant sur l'articulation T7-T8. La main droite appuie sur l'articulaire T6-T7 au moyen du pisiforme. Les mains du praticien doivent être perpendiculaires l'une à l'autre.*

*Figures 3,4,5 et 6 : Ces images correspondent à la mise en tension du segment. La main droite du médecin, au moyen de l'appui par le pisiforme, exécute une rotation dans le sens anti horaire pour arriver en fin de mouvement avec les deux mains parallèles.*



*Figure 3*



*Figure 4*



*Figure 5*



*Figure 6*



**Figure 7 : Déclenchement**

*La main gauche maintient le blocage de l'articulaire inférieure par sa pression. La main droite appuyée, par le pisi-forme, de haut en bas et vers l'avant. L'extension des deux coudes doit être rapide, à la fin d'une expiration, avec un relâchement simultané des deux épaules.*

# HEXAQUINE

## CRAMPES MUSCULAIRES

<b>Composition :</b>	pour 1 suppositoire	pour 1 comprimé enrobé
Benzoate de Quinine	0,30 g	0 120 g
Chlorhydrate de Thiamine	90 mg	32 mg
Gomenol	0,30 g	0,01g

Colorants : jaune orangé S, cocchine nouvelle, indigotine. **PROPRIÉTÉS** : la quinine a une action curarisante et antitétanique sur le muscle strié. Elle augmente la période réfractaire et diminue l'excitabilité de la plaque motrice. **CONTRE-INDICATIONS** : myasthénie, maladie de Stokes-Adams, fibrillation auriculaire, traitements concomitants par la Quinidine ou la Chloroquine. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : derniers mois de la grossesse : à ces doses, la Quinine ne peut déclencher le travail ; par contre elle serait susceptible d'augmenter les contractions existantes. **EFFETS INDÉSIRABLES** : aux doses maximales : possibilité de manifestations cutanées et de bourdonnements d'oreilles. **POSOLOGIE** : 1 suppositoire ou 3 comprimés par jour. (Coût du traitement journalier : F. 2,80). Suppositoires : boîte de 6 : F. 16,80 - Comprimés enrobés : boîte de 18 : F. 15,90. Remboursé SS à 65% - Médicament autorisé N° 3049484 et 3049478 - VISAS 18813835-12016.

**Laboratoire du Gomenol - 48, rue des Petites-Ecuries - 75010 Paris.**